

Wiadomości

Poniedziałek, 12 września 2011

Szczepienie lisów

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

nie wchodzić na teren lasu;

zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach;

nie podnosić, nie dotykać, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez spojówkę oka, błonę śluzową jamy ustnej i nosa bądź skaleczenia na rękach;

w razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej;

kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;

nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Przynęta jest okrągła. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepień lisów udziela Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii- lek. wet. Grzegorz Kawiecki.